

CBMaths.fr
<https://cbmaths.fr>

CAPES de Mathématiques session 2020— Épreuve de mise en situation professionnelle

LEÇON n° 14
Relations métriques et angulaires dans le triangle.

Clément BOULONNE

Propositions de plan et de contenu

Dernière mise à jour : 18 août 2020

Préambule

Niveau de la leçon

Lycée

Prérequis

Géométrie du triangle

Références

- G. COSTANTINI, *Trigonométrie, relations métriques dans un triangle*.
- Contributeurs de WIKIPÉDIA, *Théorème de Pythagore*, Wikipédia.
- M. LEZEN, *Leçon n° 32 : Relations métriques dans un triangle. Trigonométrie. Applications*.
URL : <http://capes-de-maths.com>.
- Contributeurs de WIKIPÉDIA, *Inégalité triangulaire*, Wikipédia.
- Contributeurs de WIKIPÉDIA, *Théorème de la médiane*, Wikipédia.
- Contributeurs de WIKIPÉDIA, *Somme des angles dans un triangle*, Wikipédia.

Plan de la leçon

1	Relations métriques dans le triangle	2
2	Relations angulaires dans le triangle	9
3	Applications	14

1 Relations métriques dans le triangle

1.1 Inégalité triangulaire

Propriété 14.1.

Dans un plan euclidien, soit un triangle ABC . Alors les longueurs AB , AC et CB vérifient les trois inégalités suivantes :

$$AB \leq AC + CB;$$

$$AC \leq AB + BC;$$

$$BC \leq BA + AC.$$

Réciproquement, étant données trois longueurs dont chacune est inférieure à la somme des deux autres, il existe un triangle ayant ces longueurs de côté.

Cas d'égalité :

$$AB = AC + CB \Leftrightarrow C \in [AB].$$

Démonstration. \diamond Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel et $(x, y) \in E^2$. On a :

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2 \langle x, y \rangle.$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, $\langle x, y \rangle \leq |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$. D'où :

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2 \|x\| \|y\|.$$

Et donc :

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Cas d'égalité : supposons que $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$ et $y \neq 0$. Par ce qui précède, on a donc :

$$\langle x, y \rangle = |\langle x, y \rangle| = \|x\| \|y\|.$$

Donc, par le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz, $x = \lambda y$ avec $\lambda = \langle x, y \rangle / \|y\|^2 = \|x\| / \|y\| \geq 0$. Finalement, on a bien $\lambda y = \mu x$ avec $\mu = 1$. \square

Pour les cinquièmes,

Propriété 14.2.

Dans un triangle non aplati, la longueur de chaque côté est inférieure à la somme des deux autres côtés.

Conséquence 14.3.

Pour tous points A , B et C du plan, si $AC < AB + BC$ alors on peut construire un triangle ABC .

Autre formulation :




Proposition 14.4.

Pour savoir si un triangle est constructible avec trois longueurs données, il faut que la somme des deux plus petites longueurs soit supérieure à la plus grande.




Exemples 14.5.


1. On veut savoir si le triangle ABC est constructible si $AB = 7$ cm, $BC = 3$ cm et $AC = 6$ cm. Le plus grand côté est 7 et $7 < 3 + 6$ ou encore $AB < AC + BC$ donc oui le triangle est constructible.



2. On veut savoir si le triangle EDF est constructible si $ED = 9$ cm, $EF = 2$ cm et $DF = 6$ cm. Le plus grand côté est 9 or 9 n'est pas plus petit que $2 + 6$ donc le triangle EDF n'existe pas.



3. Cas particulier : Si $DF = 6$ cm et $EF = 3$ cm alors $DE = DF + EF$. On dit alors que le triangle est aplati.



Propriété 14.6.

Si le point B appartient au segment $[AC]$ alors $AC = AB + BC$.

Le point B appartient au segment $[AC]$ signifie aussi que les 3 points A , B et C sont alignés.

1.2 Théorème de Pythagore

Théorème 14.7. Théorème de Pythagore

ABC est un triangle rectangle en A si et seulement si $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

◇ *Démonstration du théorème de Pythagore.* Dans le plan muni d'un repère orthonormé, les vecteurs portés par les côtés du triangle ABC vérifient la relation de Chasles :

$$\vec{BC} = \vec{AB} + \vec{AC}.$$

Ainsi :

$$BC^2 = \vec{BC} \cdot \vec{BC} = (\vec{AB} + \vec{AC}) \cdot (\vec{AB} + \vec{AC}) = AB^2 + AC^2 + 2\vec{AB} \cdot \vec{AC}$$

donc la relation du théorème est équivalente à l'annulation du dernier produit scalaire, ce qui correspond précisément au cas où les vecteurs sont orthogonaux, autrement dit lorsque les côtés $[AB]$ et $[AC]$ forment un angle droit. \square

Exemple 14.8. Escargot

On part d'un triangle isocèle rectangle dont les côtés autres que l'hypoténuse mesurent 1 unité. L'hypoténuse mesure alors $\sqrt{2}$ unités. On place un triangle rectangle sur cette hypoténuse, son côté adjacent à l'angle droit mesurant 1 unité. Alors l'hypoténuse de ce nouveau triangle mesure $\sqrt{3}$ unités, et ainsi de suite...





FIGURE 1 – Escargot

1.3 Formules d'Al-Khashi

 **Theoreme 14.9.** *Formule d'Al-Kashi*

Dans un triangle ABC ,


$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}.$$

◇ *Démonstration du théorème 14.9.* Si on note $a = BC$, $b = AC$ et $c = AB$, on a :

$$\begin{aligned} a^2 = BC^2 &= \overrightarrow{BC}^2 = (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC})^2 = BA^2 + AC^2 + 2(\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC}) \\ &= c^2 + b^2 + 2bc \cos(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{AC}) \end{aligned}$$

Or $\cos(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{AC}) = \cos[\pi + (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})] = -\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = -\cos \hat{A}$. □

1.4 Formule des 3 sinus

 **Theoreme 14.10.** *Formule des 3 sinus*

Soit ABC un triangle (on note $a = BC$, $b = AC$, $c = BA$), S l'aire de ce triangle et R le rayon du cercle circonscrit au triangle :

$$\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}} = \frac{abc}{2S} = 2R.$$

Démonstration du théorème 14.10. On note H le pied de la hauteur issue de A dans le triangle ABC .


- Dans le cas où \hat{B} est obtus, $AH = AB \sin(\pi - \hat{B}) = AB \sin \hat{B} = c \sin \hat{B}$.
- Dans le cas où \hat{B} est aigu, $AH = AB \sin \hat{B} = c \sin \hat{B}$.

Donc, dans tous les cas, $AH = c \sin \hat{B}$ et $S = \frac{1}{2}BC \cdot AH = \frac{1}{2}ac \sin \hat{B}$. D'où

$$S = \frac{1}{2}ac \sin \hat{B} = \frac{1}{2}ab \sin \hat{C} = \frac{1}{2}bc \sin \hat{A}.$$

□

1.5 Théorème de la médiane

 **Theoreme 14.11.** *Théorème d'Apollonius*

Soient ABC un triangle quelconque et (AI) la médiane issue de A . On a alors la relation suivante :

$$AB^2 + AC^2 = 2BI^2 + 2AI^2$$

ou encore :

$$AB^2 + AC^2 = \frac{1}{2}BC^2 + 2AI^2$$

◇ *Démonstration par le produit scalaire.* Cette propriété est un cas simple de la réduction de la fonction scalaire de Leibniz : il suffit de faire intervenir le point I dans les deux vecteurs \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} , par la relation de Chasles :

$$AB^2 + AC^2 = (\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB})^2 + (\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IC})^2.$$

Si on développe l'expression de droite, on obtient :


$$AB^2 + AC^2 = AI^2 + IB^2 + 2\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{IB} + AI^2 + IC^2 + 2\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{IC}.$$

Le point I est milieu de $[BC]$ donc \overrightarrow{IB} et \overrightarrow{IC} sont opposés, ce qui implique que les produits scalaires s'éliminent et $IC^2 = IB^2$ donc :

$$AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + 2IB^2.$$

□

◇ *Démonstration sans le produit scalaire.* Soit H le pied de la hauteur issue de A .



Les trois triangles AHB , AHC et AHI sont rectangle en H ; en leur appliquant le théorème de Pythagore, on obtient :

$$AB^2 = AH^2 + HB^2, \quad AC^2 = AH^2 + HC^2 \quad \text{et} \quad AI^2 = AH^2 + HI^2.$$

On en déduit :

$$AB^2 + AC^2 = HB^2 + HC^2 + 2AH^2 = HB^2 + HC^2 + 2(AI^2 - HI^2).$$

On exprime HB et HC en fonction de HI et BI . Quitte à intervertir B et C si nécessaire, on peut toujours supposer que B et H sont du même côté de I . Alors :

$$HB = |HI - BI| \quad \text{et} \quad HC = HI + IC = HI + BI.$$

On peut donc transformer, dans l'expression ci-dessus de $AB^2 + AC^2$, la sous-expression

$$\begin{aligned} HB^2 + HC^2 &= (HI - BI)^2 + (HI + BI)^2 \\ &= HI^2 - 2HI \cdot BI + BI^2 + HI^2 + 2HI \cdot BI + BI^2 \\ &= 2HI^2 + 2BI^2. \end{aligned}$$

En remplaçant, on obtient :

$$AB^2 + AC^2 = 2HI^2 + 2BI^2 + 2(AI^2 - HI^2) = 2BI^2 + 2AI^2$$

□

Exemple 14.12.

Soit A et B deux points tels que $AB = 2$. On cherche à déterminer l'ensemble E des points M tels que $MA^2 + MB^2 = 20$. On utilise le théorème de la médiane :

$$MA^2 + MB^2 = 20 \Leftrightarrow 2IM^2 + \frac{AB^2}{2} = 20 \Leftrightarrow 2IM^2 + \frac{4}{2} = 20 \Leftrightarrow IM^2 = 9 \Leftrightarrow IM = 3$$

(car $IM > 0$). L'ensemble E est donc le cercle de centre I et de rayon 3.




FIGURE 2 – Construction de l'ensemble E de l'exemple 14.12


1.5.1 Théorème de Thalès

Théorème 14.13.

Soit deux droites d et d' sécantes en un point A ; B et M deux points de d distinct de A et C et N deux points de d' distinct de A (A, B et M alignés dans le même ordre que A, C et N). Alors :

$$(BC) \parallel (MN) \Leftrightarrow \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

Démonstration. \diamond On considère les triangles AMN et BNA .



On a : $2\mathcal{A}(AMN) = AM \cdot NI$ et $2\mathcal{A}(BNA) = AB \cdot IN$ donc on a :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{\mathcal{A}(AMN)}{\mathcal{A}(BNA)}.$$

De plus, $2\mathcal{A}(AMN) = AN \cdot MJ$ et $2\mathcal{A}(CMA) = AC \cdot MJ$ donc

$$\frac{AN}{AC} = \frac{\mathcal{A}(AMN)}{\mathcal{A}(CMA)}.$$

Maintenant, montrons que $\mathcal{A}(BNA) = \mathcal{A}(CMA)$. Ceci revient à montrer que $\mathcal{A}(MFB) = \mathcal{A}(CFN)$: (MN) et (BC) sont parallèles donc on en déduit que $\mathcal{A}(BNM) = \mathcal{A}(CMN)$: même base et même hauteur. Or :

$$\mathcal{A}(BNM) = \mathcal{A}(BMF) + \mathcal{A}(FMN) \quad \text{et} \quad \mathcal{A}(CMN) = \mathcal{A}(CFN) + \mathcal{A}(FMN),$$

ce qui démontre l'égalité.

Ainsi, comme $\mathcal{A}(BNA) = \mathcal{A}(CMA)$, on a alors :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{\mathcal{A}(AMN)}{\mathcal{A}(BNA)} = \frac{\mathcal{A}(AMN)}{\mathcal{A}(CMA)} = \frac{AN}{AC}.$$

Montrons maintenant la deuxième égalité en considérant le parallélogramme $MNCD$: d'après ce que l'on vient de démontrer, en se plaçant dans le triangle ABC , on a $\frac{BM}{BA} = \frac{BD}{BC}$, d'où :

$$\frac{BA - MA}{BA} = \frac{BC - DC}{BC} \Leftrightarrow \frac{AM}{AB} = \frac{DC}{BC} = \frac{MN}{BC}$$

car $MNCD$ est un parallélogramme. On a ainsi démontré l'implication directe.

Réciproque : elle utilise le sens direct.

Soit le point E de d tel que (NE) est parallèle à (BC) , alors A , E et B sont alignés dans le même ordre que A , N et C et donc on peut appliquer le sens direct :

$$\frac{AE}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{AM}{AB}$$

d'après l'hypothèse. Donc : $\frac{AE}{AB} = \frac{AM}{AB}$ d'où $AE = AM$, les points étant tous alignés dans le même ordre, il vient que $E = M$ donc les droites (MN) et (BC) sont parallèles. \square

2 Relations angulaires dans le triangle


2.1 Somme des angles dans un triangle

Propriété 14.14.

Dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180° .

Démonstration. \diamond

Soit ABC un triangle. On note $\alpha = \widehat{BAC}$, $\beta = \widehat{ABC}$ et $\gamma = \widehat{ACB}$.



On trace (d) la droite parallèle à (BC) passant par A . Soit D un point « à gauche » de A sur la droite (d) et E un point « à droite » de A sur la droite (d) .


Comme (d) est parallèle à (BC) , les angles alternes-internes qui forment sont égaux. Ainsi les angles β et \widehat{DAB} sont de même mesure (de même pour γ et \widehat{EAC}). Les angles \widehat{DAB} , \widehat{BAC} , \widehat{EAC} sont adjacents et forment tous les trois un angle droit. Ainsi :

$$\widehat{DAB} + \widehat{BAC} + \widehat{EAC} = \beta + \alpha + \gamma = \alpha + \beta + \gamma = 180^\circ.$$

□

Exemple 14.15.

Dans la figure ci-dessous, on veut calculer la mesure de l'angle \widehat{MNP} .



Dans le triangle MNP , on a :

$$\widehat{MPN} + \widehat{NMP} = 117^\circ + 32^\circ = 149^\circ.$$

Or, dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180° . Donc : $\widehat{MNP} = 180^\circ - 149^\circ = 31^\circ$.

2.2 Trigonométrie dans un triangle rectangle



Définition 14.16.

Dans un triangle ABC rectangle en A , on définit le *sinus*, le *cosinus* et la *tangente* de l'angle aigu \widehat{ABC} de la manière suivante :

$$\begin{aligned}\sin \widehat{ABC} &= \frac{\text{côté opposé à } \widehat{ABC}}{\text{hypoténuse}} = \frac{AC}{BC} \\ \cos \widehat{ABC} &= \frac{\text{côté adjacent à } \widehat{ABC}}{\text{hypoténuse}} = \frac{AB}{BC} \\ \tan \widehat{ABC} &= \frac{\text{côté opposé à } \widehat{ABC}}{\text{côté adjacent à } \widehat{ABC}} = \frac{AC}{AB}.\end{aligned}$$




FIGURE 3 – Côté opposé, côté adjacent à un angle, hypoténuse



Remarque 14.17.

On a aussi avec l'angle \widehat{ACB} :

$$\cos \widehat{ACB} = \frac{AC}{BC}, \quad \sin \widehat{ACB} = \frac{AB}{BC}, \quad \tan \widehat{ACB} = \frac{AB}{AC}.$$



Propriété 14.18.

Le sinus et le cosinus d'un angle aigu sont strictement plus grands que 0 et strictement plus petits que 1 et ils n'ont pas d'unité.

2.3 Formules trigonométriques



Propriété 14.19.

Pour toutes valeurs de x , on a :

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \quad \text{et} \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$


Proposition 14.20. *Formules d'addition*

1. $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$,
2. $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$,
3. $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$,
4. $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$.

◇ *Justification d'une formule de trigonométrie.*

Méthode utilisant le produit scalaire On va étudier la quantité $\cos(a - b)$ où a et b sont deux nombres réels. Dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) , considérons deux vecteurs \vec{u} et \vec{v} unitaires tels que :

$$(\vec{i}, \vec{u}) = a \quad \text{et} \quad (\vec{i}, \vec{v}) = b.$$



Une première expression du produit scalaire donne :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \cos(\vec{u}, \vec{v}).$$

D'après la relation de Chasles :

$$(\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{u}, \vec{i}) + (\vec{i}, \vec{v}) = b - a$$

donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = \cos(b - a) = \cos(a - b)$ car la fonction cosinus est paire. D'autre part, d'après la définition du cosinus et du sinus, on a :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} \cos a \\ \sin a \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} \cos b \\ \sin b \end{pmatrix}$$


D'après l'expression du produit scalaire avec les coordonnées $(xx' + yy')$, on obtient alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$

Ce qui nous donne une formule trigonométrique :

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$

Méthode n'utilisant pas le produit scalaire On étudie cette fois-ci $\cos(a + b)$ où a et b sont deux nombres réels. On considère le cercle de centre O et de rayon 1 dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) . Sur ce cercle, on place un point A tel que $(\vec{OI}, \vec{OA}) = a$, le point M tel que $(\vec{OA}, \vec{OM}) = b$ et le point A' tel que $(\vec{OA}, \vec{OA}') = \frac{\pi}{2}$.



D'après la relation de Chasles pour les angles, on a :

$$(\vec{OI}, \vec{OM}) = (\vec{OI}, \vec{OA}) + (\vec{OA}, \vec{OM}) = a + b \pmod{2\pi}$$

Donc :

$$\vec{OM} = \cos(a + b)\vec{OI} + \sin(a + b)\vec{OJ}.$$

Mais en se plaçant dans le repère orthonormé (O, A, A') , on a :

$$\vec{OM} = \cos(b)\vec{OA} + \sin(b)\vec{OA}'$$

et en exprimant les coordonnées des vecteurs \vec{OA} et \vec{OA}' dans le repère (O, \vec{i}, \vec{j}) , on a :

$$\vec{OA} = \cos(a)\vec{OI} + \sin(a)\vec{OJ}$$

et

$$\vec{OA}' = \cos\left(\frac{\pi}{2} + a\right)\vec{OI} + \sin\left(\frac{\pi}{2} + a\right)\vec{OJ} = -\sin(a)\vec{OI} + \cos(a)\vec{OJ}.$$


Finalement :

$$\begin{aligned} \vec{OM} &= \cos(b)\cos(a)\vec{OI} + \cos(b)\sin(a)\vec{OJ} - \sin(b)\sin(a)\vec{OI} + \sin(b)\cos(a)\vec{OJ} \\ &= [\cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)]\vec{OI} + [\sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)]\vec{OJ} \end{aligned}$$

et par unicité des coordonnées d'un vecteur dans un repère, il vient les deux relations :

$$\begin{aligned} \cos(a + b) &= \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) \\ \sin(a + b) &= \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b) \end{aligned}$$

□


 **Proposition 14.21.** *Formules de duplication*

1. $\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a$,
2. $\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$.

◇ *Démonstration de la proposition 14.21.*

$$\begin{aligned}\cos(2a) &= \cos(a+a) = \cos a \cos a - \sin a \sin a = \cos^2 a - \sin^2 a \\ \sin(2a) &= \sin(a+a) = \sin a \cos a + \cos a \sin a = 2 \sin a \cos a\end{aligned}$$

□

 **Proposition 14.22.** *Formule de linéarisation*

1. $\cos^2 a = \frac{1+\cos(2a)}{2}$,
2. $\sin^2 a = \frac{1-\cos(2a)}{2}$.

◇ *Démonstration de la proposition 14.22.* On rappelle que $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ quelque soit le réel x . Donc :

$$\cos(2a) = \cos^2 a - (1 - \cos^2 a) = 2 \cos^2 a - 1,$$

d'où $\cos^2 a = \frac{1+\cos(2a)}{2}$. De même,

$$\cos(2a) = (1 - \sin^2 a) - \sin^2 a = 1 - 2 \sin^2 a,$$

d'où $\sin^2 a = \frac{1-\cos(2a)}{2}$.

□

 **Exemple 14.23.**

On va calculer les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{8}$, $\sin \frac{\pi}{8}$, $\cos \frac{\pi}{12}$, $\sin \frac{\pi}{12}$. En utilisant les formules de linéarisation :

$$\cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 + \cos \frac{\pi}{4}}{2} = \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4}$$

et comme $\cos \frac{\pi}{8} > 0$, il vient $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$

$$\sin^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 - \cos \frac{\pi}{4}}{2} = \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}$$

et comme $\sin \frac{\pi}{8} > 0$, il vient $\sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$. D'où :

$$\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}}}$$

Or :

$$\frac{2 - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}} = \frac{(2 - \sqrt{2})^2}{(2 - \sqrt{2})(2 + \sqrt{2})} = \frac{6 - 4\sqrt{2}}{4 - 2} = 3 - 2\sqrt{2} = 1 - 2\sqrt{2} + 2 = (1 - \sqrt{2})^2.$$

D'où :

$$\tan \frac{\pi}{8} = |1 - \sqrt{2}| = \sqrt{2} - 1.$$

En utilisant les formules d'addition :

$$\begin{aligned}\cos \frac{\pi}{12} &= \cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} \\ \sin \frac{\pi}{12} &= \sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}.\end{aligned}$$

D'où

$$\tan \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2}{(\sqrt{6} + \sqrt{2})(\sqrt{6} - \sqrt{2})} = \frac{8 - 2\sqrt{12}}{6 - 2} = 2 - \sqrt{3}.$$

3 Applications

Exemple 14.24.

On considère trois carrés disposés comme dans la figure 4. Montrer que $\alpha = \beta + \gamma$. On a bien sûr $\alpha = \frac{\pi}{4}$. On montre donc que $\beta + \gamma = \frac{\pi}{4}$. D'après une formule d'addition :

$$\cos(\beta + \gamma) = \cos \beta \cos \gamma - \sin \beta \sin \gamma.$$

Or, si l'on note a la longueur des côtés des carrés, on a (d'après le théorème de Pythagore et les relations du cosinus et du sinus dans un triangle rectangle) :

$$\begin{aligned}\cos \beta &= \frac{2a}{\sqrt{5}a} = \frac{2}{\sqrt{5}}, \quad \cos \gamma = \frac{3a}{\sqrt{10}a} = \frac{3}{\sqrt{10}} \\ \sin \beta &= \frac{a}{\sqrt{5}a} = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad \sin \gamma = \frac{a}{\sqrt{10}a} = \frac{1}{\sqrt{10}}.\end{aligned}$$

Donc :

$$\cos(\beta + \gamma) = \frac{2}{\sqrt{5}} \times \frac{3}{\sqrt{10}} - \frac{1}{\sqrt{5}} \times \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \frac{5}{\sqrt{5}\sqrt{5}\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Et comme $0 < \beta + \gamma < \pi$, on a bien $\beta + \gamma = \frac{\pi}{4}$.

Exemple 14.25.

Soit ABC un triangle avec $a = 2$, $b = 3$ et $c = 4$. Calculer la valeur exacte de l'aire S de ABC .

D'après la formule d'Al-Kashi :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}.$$




FIGURE 4 – Figure de l'exemple

Donc :

$$\cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}.$$

On remplace par les valeurs numériques :

$$\cos \hat{A} = \frac{9 + 16 - 4}{24} = \frac{7}{8}.$$

Or $\cos^2 \hat{A} + \sin^2 \hat{A} = 1$, donc :

$$\sin^2 \hat{A} = 1 - \frac{49}{64} = \frac{15}{64}.$$

Or ABC étant un triangle, l'angle \hat{A} est compris entre 0 et π rad donc son sinus est positif. D'où :

$$\sin \hat{A} = \frac{\sqrt{15}}{8}.$$

Enfin, d'après la formule de l'aire du triangle, on obtient :

$$S = \frac{1}{2}bc \sin \hat{A} = \frac{3\sqrt{15}}{4}.$$

✻ Exemple 14.26.

Soit ABC un triangle avec $b = 3$, $c = 8$ et $\hat{A} = 60^\circ$. Calculer la valeur exacte de a ainsi que \hat{B} et \hat{C} (en degrés à 10^{-1} près).

D'après la formule d'Al-Kashi :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 9 + 64 - 48 \times \frac{1}{2} = 49.$$

D'où $a = 7$. On peut déterminer $\cos \hat{B}$ à l'aide de la formule d'Al-Kashi :

$$\cos \hat{B} = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{13}{14}.$$

On a $\cos B > 0$ et ABC triangle donc $B \in]0, 90[$. On calcule donc $\hat{B} = \arccos \frac{13}{14} \simeq 21,8^\circ$. On peut calculer \hat{C} avec la relation $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$. Ainsi :

$$\hat{C} = 180 - 21,8 - 60 = 98,2^\circ.$$

Exemple 14.27. Aire maximale d'un rectangle inscrit dans un cercle

Soit \mathcal{C} un cercle de rayon 1 cm. Quelle est l'aire maximale d'un rectangle dont les sommets sont sur le cercle \mathcal{C} .

On note O le centre du cercle et soit I et K deux points diamétralement opposés. Soit M un point mobile sur le cercle et on note x une mesure en radian de l'angle $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM})$. Enfin, on note M' le point diamétralement opposé à M . D'après la formule de l'aire d'un triangle exprimée avec un sinus :

$$\mathcal{A}(MOI) = \frac{1}{2} OM \times OI \sin x.$$

Comme le rayon du cercle est égal à 1 :

$$\mathcal{A}(MOI) = \frac{1}{2} \sin x.$$

Enfin, les diagonales d'un rectangle partagent celui-ci en quatre triangles de même aire (puisque la médiane dans un triangle partage celui-là en deux triangles de même aire) donc :

$$\mathcal{A}(MKM'I) = 2 \sin x.$$

L'aire du rectangle inscrit dans le cercle est donc maximale lorsque le sinus l'est, à savoir pour $x = \frac{\pi}{2}$, c'est-à-dire lorsque le rectangle est un carré ; l'aire maximale est alors de 2 cm^2 .




FIGURE 5 – Figure de l'exemple

Exemple 14.28. Formule de Héron

Soit ABC un triangle de demi-périmètre p (p est défini par la relation $2p = a + b + c$). On montre que l'aire \mathcal{S} de ABC est donnée par :

$$\mathcal{S} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad (\text{formule de Héron}).$$

D'après la formule d'Al-Kashi, on a :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \widehat{A}.$$

$$\begin{aligned} \cos \widehat{A} &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ 1 - \cos \widehat{A} &= 1 - \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{a^2 - (b^2 - 2bc + c^2)}{2bc} \\ &= \frac{a^2 - (b - c)^2}{2bc} = \frac{(a - b + c)(a + b - c)}{2bc} \\ 1 + \cos \widehat{A} &= 1 + \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{(b^2 + 2bc + c^2) - a^2}{2bc} \\ &= \frac{(b + c)^2 - a^2}{2bc} = \frac{(b + c - a)(b + c + a)}{2bc} \end{aligned}$$

D'où :

$$\begin{aligned} \sin^2 \widehat{A} &= 1 - \cos^2 \widehat{A} \\ &= (1 - \cos \widehat{A})(1 + \cos \widehat{A}) = \frac{(a - b + c)(a + b - c)(b + c - a)(a + b + c)}{4b^2c^2} \\ 4b^2c^2 \sin^2 \widehat{A} &= (2p - 2b)(2p - 2c)(2p - 2a)(2p) = 16p(p - a)(p - b)(p - c). \end{aligned}$$

En outre,

$$\mathcal{S}^2 = \frac{1}{4}b^2c^2 \sin^2 \widehat{A} = p(p - a)(p - b)(p - c).$$

D'où la formule de Héron.

Exemple 14.29. Inégalités dans le triangle

Soit ABC un triangle. On note $a = BC$, $b = AC$, et $c = AB$. On va montrer que :

$$|b - c| \leq a \leq b + c.$$

D'après la formule d'Al-Kashi, on a :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \widehat{A} \Leftrightarrow \cos \widehat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}.$$

On en déduit l'encadrement :

$$-2bc \leq a^2 - b^2 - c^2 \leq 2bc.$$

D'où $(b - c)^2 \leq a^2 \leq (b + c)^2$. Par croissance de l'application $t \mapsto \sqrt{t}$ sur $[0, +\infty[$, on obtient :

$$|b - c| \leq |a| \leq |b + c|.$$

Comme a, b et c sont des quantités positives :

$$|b - c| \leq a \leq b + c.$$

Autres applications :

 **Exemple 14.30.**

On construit un puit de pétrole P . À 530 m du coin du champ rectangulaire, à 210 m du coin C opposé, à 105 m du coin B .

À quelle distance se trouve-t-il du quatrième coin ?

 **Exemple 14.31.**

On considère un triangle ABC . On construit les carrés $ABEF$ et $ACGH$ extérieurement au triangle.

Montrer que $FC = BH$.